

J200143

广东省卫生健康委员会

特急

粤卫疾控函〔2020〕11号

广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组关于 印发预防新冠肺炎粪-口传播公众指引的通知

各地级以上市新冠肺炎防控指挥办，省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组各相关成员单位：

新冠肺炎防控进展提示新冠病毒还可通过潜在的粪-口途径传播。为进一步科学指导全省防控工作，我们组织编写了预防新冠肺炎粪-口传播公众指引，现印发给你们，请参照执行。

附件：预防新冠肺炎粪-口传播公众指引

广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组

(代章)

2020年2月15日



附件

预防新冠肺炎粪-口传播公众指引

新冠肺炎是一种新发疾病，防控进展提示新冠病毒还可通过潜在的粪-口途径传播。根据目前对该疾病的认识制定本指引，为公众个人预防新冠肺炎粪-口传播提供指导。

一、保证厨房清洁和饮食安全卫生。喝开水，彻底煮熟食物，分开处理生熟食物，以免食物交叉污染。建议实行分餐制，用膳时要用公筷及公勺。不要接触、购买和食用野生动物（即野味）。

二、随时保持手卫生。减少接触公共场所的公共物品和部位；从公共场所返回、饭前便后、咳嗽手捂之后、擦眼睛前后、接触宠物或家禽后、接触病人前后等应及时用洗手液或香皂流水洗手。不确定手是否清洁时，避免用手接触口鼻眼。如无条件洗手，可使用免洗手消毒液消毒双手。

三、保持生活用品清洁。家庭成员间毛巾、玩具和生活用品等应尽量分开，保持家居、餐具、用品清洁，勤晒衣被。

四、做好环境和物品的消毒。地面及桌椅台面、床围栏、门把手、电话、玩具等物体表面应每天清洁，每周使用含氯消毒剂或 75% 乙醇消毒液消毒 1-2 次；流行区域应增加消毒频次。餐饮具、奶瓶每次使用前应煮沸 15-30min 或高温消毒。随身携带的手机和钥匙使用消毒湿巾或 75%乙醇消毒液擦拭。

五、加强厕所通风和清洁消毒。每天开窗通风 2-3 次，每次不少于 30 分钟。每天对厕所墙壁、地面、水龙头、门把手，及马桶盖、马桶座等物体表面进行消毒；便器表面用含有效氯 500mg/L 消毒剂溶液擦拭消毒，作用 30min，必要时用清水冲洗或擦拭干净。被呼吸道分泌物、粪便等污染的物品或表面，清洁后进行擦拭或浸泡消毒。厕所要配备足够的洗手液或肥皂，保证水龙头等供水设施正常使用。

六、注意如厕卫生。盖上座厕马桶盖后再冲厕，避免污水外溅，使用过的厕纸应放马桶里冲走，不得放置在厕所里。

七、保持渠管畅通及没有渗漏，切勿擅自将渠管改道。定期注水进下水道排水口内，以防昆虫及臭气经排水口进入室内。对于下水道密闭性不严格的小区，如发现反水、漏水，应当加强马桶或便器的密封性。

八、接触排泄物后应及时洗手。家长及看护人员在接触儿童前、替儿童更换尿布、处理儿童粪便及呼吸道分泌物后均要洗手。尿布、毛巾、衣物、被褥等应经常换洗与晾晒。

公开方式：主动公开

抄送：省新冠肺炎防控指挥办。

校对：疫情防控组 吴晓程

(共印 8 份)